




Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

18M - Typischer Karbonat-Tannen-Buchenwald *Adenostylo glabrae-Abieti-Fagetum typicum*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	1/2 (1/2)
Vorwaldarten	HBi, RHol
Verdichtungsrisiko	mittleres Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen bedeutende Verdichtung möglich)
Priorität	-
Eignung	PR: Sehr wüchsiger Standort mit grossem Baumartenspektrum. NG: In steilen Lagen etwas rutschgefährdet, da labile Oberfläche. NS: Etwas erhöhte Bedeutung, v. a. wenn kalkreich.
Verjüngung und Entwicklung	N: Bu und Ta unter Schirm, Übrige in Lücken und im Seitenlicht. Durch kleinflächige Auflichtungen und das Schaffen von Seitenlicht wird meist reiche Ansamung gefördert; für Lichtbaumarten Verjüngungshiebe bis Gruppengrösse (in steilen Lagen kleinflächiger). Gruppenplenterung bis kleinflächiger Femelschlag. U: Oft vorhandene Ansamung durch Verjüngungshiebe begünstigen. Kleinflächig vorgehen, nur in Ausnahmen mehr als Truppgrösse.
Pflege	N: Bei Femelschlag: Mischungsregulierung ab Dichtung, mehrmals Durchforstung bis BH 1. Auf starke Kronenausbildung achten. Pflege lohnend. Bei Plenterung nur Schlagpflege nötig. Mischungsform: Einzel bis gruppenweise. U: Punktuelle Eingriffe zur Förderung einer kleinflächig stufigen Struktur.
Beschreibung	Wüchsige Mischbestände von Bu, Ta und Fi an vorwiegend steilen Hängen aller Expositionen, oft Beimischung von Bah, sowie Es und BUI. Unterwuchs von Binkelkraut dominiert. Boden basen- und nährstoffreicher als 18, meist kalkhaltig.
Höhenverbreitung	obermontan; 900-1400m
Relief	

Hangneigung & Exposition																	
Vegetation	<p>E: Ährige Rapunzel, Breitblättriger Ehrenpreis, Sanikel F: Wald-Segge, Weisse Pestwurz L: Schwarzes Geissblatt, Alpen-Hagrose, Gelappter Schildfarn M: Bingelkraut, Wald-Zwenke O: Berg-Flockenblume, Dreiblatt-Baldrian</p>																
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="448 613 1059 1072"> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>G: Nährstoffzeiger, tonig</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>H: Nährstoffzeiger, feucht</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>J: Hochstauden</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>L: Montan-Zeiger (Bergstufe)</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>M: Basen- und Kalkzeiger</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselftrocken</td> <td>+</td> </tr> </table>	E: Buchenwaldarten	■	F: Nährstoffzeiger, frisch	■	G: Nährstoffzeiger, tonig	+	H: Nährstoffzeiger, feucht	+	J: Hochstauden	+	L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	■	M: Basen- und Kalkzeiger	□	O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselftrocken	+
E: Buchenwaldarten	■																
F: Nährstoffzeiger, frisch	■																
G: Nährstoffzeiger, tonig	+																
H: Nährstoffzeiger, feucht	+																
J: Hochstauden	+																
L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	■																
M: Basen- und Kalkzeiger	□																
O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselftrocken	+																
Boden	<table border="1" data-bbox="448 1099 1145 1272"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>BASEN: Kalk</td> <td>□</td> </tr> </table>	L: Streuhorizont	+	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	■	BASEN: Kalk	□										
L: Streuhorizont	+																
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	■																
BASEN: Kalk	□																