

# Waldbaukommentar Luzern

## Standortstyp

[Link](#)

### 18w - Typischer Buntreitgras-Tannen-Buchenwald *Adenostylo glabrae Abieti-Fagetum calamagrostietosumvariae*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	1/3 (1/2)
Vorwaldarten	-
Verdichtungsrisiko	mittleres Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen bedeutende Verdichtung möglich)
Priorität	-
Eignung	<p>PR: Oft steiler und teils rutschiger Standort; nur ausnahmsweise Wirtschaftswald.</p> <p>NG: Oberflächlich oft bewegt, Untergrund meist solid. Dauerbestockung ist zentral!</p> <p>NS: Durch oft offenen Charakter und kalkig-mergeligen Untergrund deutlich erhöhte Vielfalt.</p>
Verjüngung und Entwicklung	<p>In lichtem Bestand für alle Baumarten meist reichlich.</p> <p>In dichteren Beständen genügen leichte Verjüngungshiebe an verjüngungsgünstigen Stellen.</p> <p>Einzel- bis Gruppenplenterung.</p>
Pflege	<p>N: Kaum notwendig; vereinzelte Eingriffe zur Förderung standfester Einzelbäume.</p> <p>Mischungsform: Einzel- bis trupp-weise.</p> <p>U: Punktuelle Eingriffe zur Förderung der Plenterstruktur.</p> <p>Schutzwald: Förderung eines grossen Baumartenspektrums mit guter Struktur und stabilen Einzelbäumen oder Gruppen ist Hauptziel; punktuelle Eingriffe bei Bedarf.</p>
Beschreibung	<p>Wenig bis ziemlich wüchsige, eher lichte und vielfältige Mischbestände von Bu, Fi und Ta an Steilhängen aller Expositionen. Unterwuchs oft mit mit grasigem Aspekt.</p> <p>Boden flach- bis mittelgründig, wechselfeucht, basenreich.</p>
Höhenverbreitung	obermontan; 1000-1400m

<b>Relief</b>																					
<b>Hangneigung &amp; Exposition</b>																					
<b>Vegetation</b>	<p>C: Breiter Wurmfarne, Heidelbeere (auf Rippen)  E: Ährige Rapunzel, Wald-Veilchen  F: Wald-Segge  L: Kahler Alpendost  M: Bingelkraut, Wald-Zwenke,  O: Buntes Reitgras, Schlawe Segge, Berg-Flockenblume, Alpenmasslieb, Rostfarbene Segge, Dreiblatt-Baldrian</p>																				
<b>Zeigergruppen</b>	<table border="1" data-bbox="459 824 1070 1391"> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>H: Nährstoffzeiger, feucht</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>J: Hochstauden</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>K: Feuchtezeiger, basenarm</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>L: Montan-Zeiger (Bergstufe)</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>M: Basen- und Kalkzeiger</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselfeucht</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>P: Trockenheitszeiger</td> <td>+</td> </tr> </table>	C: Schwache Säurezeiger	+	E: Buchenwaldarten	□	F: Nährstoffzeiger, frisch	□	H: Nährstoffzeiger, feucht	+	J: Hochstauden	+	K: Feuchtezeiger, basenarm	+	L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	■	M: Basen- und Kalkzeiger	□	O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselfeucht	■	P: Trockenheitszeiger	+
C: Schwache Säurezeiger	+																				
E: Buchenwaldarten	□																				
F: Nährstoffzeiger, frisch	□																				
H: Nährstoffzeiger, feucht	+																				
J: Hochstauden	+																				
K: Feuchtezeiger, basenarm	+																				
L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	■																				
M: Basen- und Kalkzeiger	□																				
O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselfeucht	■																				
P: Trockenheitszeiger	+																				
<b>Boden</b>	<table border="1" data-bbox="459 1422 1155 1592"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>BASEN: Kalk</td> <td>■</td> </tr> </table>	L: Streuhorizont	+	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	□	BASEN: Kalk	■														
L: Streuhorizont	+																				
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	□																				
BASEN: Kalk	■																				