




Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

44 - Seggen-Schwarzerlen-Bruchwald *Carici elongatae-Alnetum glutinosae*

Laubholzanteil					
Bestockung					
Tannenanteil min (opt)	-				
Vorwaldarten	-				
Verdichtungsrisiko	nicht befahrbar (dauernd wassergesättigt)				
Priorität	mittel				
Eignung	PR: Ohne Bedeutung. NG: Bedeutung minim, da in ebenen Lagen; wenn entwässert, verstärkter Spitzenabfluss. NS: Ausserordentlich seltener Sonderstandort von höchstem Wert; oft Renaturierungen notwendig.				
Verjüngung und Entwicklung	N: Verjüngung in lichten Beständen meist reichlich. U: Standorte meist entwässert, mit Fi-Pflanzungen, zudem oft abgetorft. Renaturierungen gemäss sorgfältigen Einzelprojekten.				
Pflege	N: Kaum notwendig. U: Gemäss Einzelprojekten.				
Beschreibung	Mässig wüchsige, lichte und lückige Schwarzerlen- bzw. Weidenbestände. Unterwuchs grasig, von Seggen und offenen Wasserflächen beherrscht.				
Höhenverbreitung	submontan, untermontan; 400-800m				
Relief					
Hangneigung & Exposition					
Vegetation	KS: Scharfkantige Segge, Gewöhnlicher Gilbweiderich. MS: spärlich.				
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="462 2004 837 2116"> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>+</td> </tr> </table>	E: Buchenwaldarten	+	F: Nährstoffzeiger, frisch	+
E: Buchenwaldarten	+				
F: Nährstoffzeiger, frisch	+				

	I: Nässezeiger	■
	J: Hochstauden	□
	K: Feuchtezeiger, basenarm	+
Boden	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	■
	BASEN: Kalk	■
	FEUCHTE: vergleyt	■