

Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

71 - Torfmoos-Bergföhrenwald *Sphagno-Pinetum montanae*

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|
| Laubholzanteil | - | | | | | | |
| Bestockung | | | | | | | |
| Tannenanteil min (opt) | - | | | | | | |
| Vorwaldarten | - | | | | | | |
| Verdichtungsrisiko | nicht befahrbar (dauernd wassergesättigt) | | | | | | |
| Priorität | hoch | | | | | | |
| Eignung | PR: Ohne Bedeutung. NG: Meist unbedeutend; wenn entwässert, dann schneller Wasserabfluss. NS: Ausserordentlich seltene Einheit mit hochspezialisierten Pflanzen und Tieren. | | | | | | |
| Verjüngung und Entwicklung | In den sehr lichten Beständen meist problemlos. | | | | | | |
| Pflege | In der Regel nicht nötig; nur in Ausnahmefällen punktuelle Auflichtungen. | | | | | | |
| Beschreibung | Lückige, sehr schwachwüchsige Bergföhrenwälder; Unterwuchs von Zwergsträuchern dominiert. | | | | | | |
| Höhenverbreitung | obermontan, hochmontan; 1300-1600m | | | | | | |
| Relief | | | | | | | |
| Hangneigung & Exposition | | | | | | | |
| Vegetation | SS: Sehr spärlich KS: Heidelbeere, Preiselbeere, Rauschbeere, Rostrote Alpenrose, Hochmoorarten MS: Torfmoose oft deckend, daneben Rotstengelmoos | | | | | | |
| Zeigergruppen | <table border="1"> <tr> <td>A: Starke Säurezeiger, feucht-nass</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td>■</td> </tr> </table> | A: Starke Säurezeiger, feucht-nass | ■ | B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken | ■ | C: Schwache Säurezeiger | ■ |
| A: Starke Säurezeiger, feucht-nass | ■ | | | | | | |
| B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken | ■ | | | | | | |
| C: Schwache Säurezeiger | ■ | | | | | | |

| | | |
|--------------|---|---|
| Boden | L: Streuhorizont | ■ |
| | F: Fermentations-Horizont | ■ |
| | H: Humus-Horizont | ■ |
| | AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch) | ■ |
| | FEUCHTE: vergleyt | ■ |